



I N C O N S C I E N C E

L I B E R A T I O N E T P R O T E C T I O N D E S V O I E S

A E R I E N N E S

Attestation de Formation aux Gestes et
Soins d 'Urgence

CESU 73

Circonstances de survenue

- V vasculaires
- I infectieuses
- I intoxications
- T toxiques internes (= métaboliques)
- T traumatiques
- T tumorale
- E épilepsie

2 pièges : - alcool
- hypoglycémie




Diagnostic de l'inconscience

- Questions simples:
 - quel est votre nom
 - que se passe t'il
- pas de réponse verbale



- Ordres simples
 - ouvrez les yeux
 - serrez moi la main
- pas de réponse aux ordres



patient inconscient => danger
- perte des réflexes de sécurité
- chute de la langue en arrière
=> gestes de sauvetage

CAT face à un patient inconscient

PATIENT INCONSCIENT

LIBERATION DES VOIES AERIENNES
bascule de la tete en arriere
inspecter l'oropharynx

VERIFIER LA RESPIRATION

POSITION D'ATTENTE ADAPTE
= " PLS "



Figure 2.6 Look listen and feel for normal breathing.
© 2005 European Resuscitation Council.



Libération des Voies Aériennes

- Desserrer, dégrafer tout ce qui peut gêner la respiration
- Bascule prudente de la tête en AR et soulèvement du menton
- Enlever dentier, corps étrangers visibles dans la bouche
- élévation du menton seule si doute sur lésion rachis cervical




Evaluer la ventilation

- Se pencher sur la victime
 - regarder (soulèvement du thorax)
 - écouter (bruits respiratoires)
 - sentir (air expiré)
- Ne respire pas
 - Pouls présent : ventiler le patient
 - Pouls absent : RCP
- patient respire => mettre le patient dans la position adaptée




Position latérale de sécurité



Que faire d 'autre

- Alerter le SAMU : 15 (1515 au CH de Chambéry)
- Prise des constantes : FC, TA, SaO2, FR, T°
- dextro +++
- O2 MHC \geq 9l/min.
- aspiration
- femme enceinte : décubitus latéral gauche
- SURVEILLANCE +++



Convulsion



- Protéger le patient
- LVA
- PLS
- oxygène MHC
- attendre la fin de la crise
- Dextro
- Etat de mal convulsif : répétition des crises
- rivotril : 1 ap 1 VL (adulte) sur prescription médicale